



INTRAVENEUS IJZERTHERAPIE

U wordt bij HartKliniek behandeld voor chronisch hartfalen. Daarnaast heeft u een ijzergebrek. Hiervoor krijgt u intraveneus (via een infuus) ijzer voorgeschreven. In deze folder vindt u een beschrijving van de ijzerbehandeling die uw cardioloog heeft voorgeschreven.

VOORBEREIDING

- U hoeft voor de behandeling niet nuchter te zijn.
- Het is fijn als u gemakkelijk zittende kleding draagt, met korte mouw of makkelijk oprolbare mouwen.
- Neem iets te lezen mee om de behandel- en wachttijd te veraangemen.
- Neem uw actueel medicatieoverzicht mee. Deze kunt u aanvragen bij uw apotheek.

Het kan zijn dat de cardioloog die de ijzerbehandeling bij u uitvoert, niet uw 'eigen' behandelend HartKliniek cardioloog is, omdat deze behandeling niet in alle vestigingen wordt uitgevoerd.

HOE VERLOOPT DE DAGBEHANDELING?

1. Uw bloeddruk, hartslag en temperatuur worden gemeten. Tevens vindt er nog een controle plaats van uw huidige medicijngebruik en eventuele allergieën.

2. U neemt plaats op het behandelbed of -stoel. De doktersassistente of de cardioloog brengt een infuus in één van de aders van uw arm. Als dat in uw arm niet mogelijk is wordt het infuus op een andere wel geschikte plek aangebracht. Via het infuus wordt vervolgens het ijzer door een ader direct het bloed ingebracht. Het infuus druppelt

langzaam. Dit duurt ongeveer 30 minuten. Er kan hierbij gebruik gemaakt worden van een automatische infuuspomp.

3. Als de toediening klaar is, verwijdt de doktersassistente het infuus uit uw arm. Indien van toepassing mag u nu uit bed. Komt u rustig overeind. U mag plaatsnemen in een stoel in de dagbehandeling. Mocht u zich niet helemaal lekker voelen, meld dit dan direct. Op deze afdeling wordt uw bloeddruk, uw hartritme en ECG gedurende 1 uur bewaakt.

4. Na de laatste controle op eventuele bijwerkingen van de ijzerbehandeling mag u naar huis. U kunt gewoon autorijden of reizen zoals u gewend bent.

5. Als u zich eenmaal thuis toch onwel voelt en/of klachten heeft, neem dan contact op met HartKliniek via 088 – 500 2000.

MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan ook het ijzer-geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Een behandeling met intraveneus ijzer kan de volgende bijwerkingen geven kort na toediening. Dit is de reden dat u nog een poosje moet wachten na de toediening, voordat u naar huis mag.

- Hoofdpijn (1-10%)
- Reactie op de plaats van het infuus (1-10%)
- Misselijkheid (1-10%)
- Duizeligheid (1-10%)
- Lage bloeddruk (1-10%)
- Rood gezicht (0,1-1%)
- Hoge hartslag (0,1-1%)
- Koorts en rillingen (0,1-1%)
- Gevoelloosheid, tintelingen of prikkend gevoel op de huid (0,1 – 1%)
- Spierpijn (0,1-1%)
- Maag- en darmproblemen (0,1-1%)
- Allergische reactie (<0,01%)

Heeft u na thuiskomst veel last van bijwerkingen?
Neem dan contact op met HartKliniek via 088 – 500 2000.

WANNEER MAG U GEEN IJZER KRIJGEN?

- Indien u overgevoelig bent ijzer (III) carboxymaltose of voor één van de hulpstoffen natriumhydroxide, zoutzuur, water voor injectie of voor andere (eerdere) via een infuus toegediende ijzerproducten.
- Indien u lijdt aan ijzerstapeling of stoornissen in het ijzerverbruik.
- Bij zwangerschap tijdens eerste trimester of indien u borstvoeding geeft.
- Bij leverfunctiestoornissen.
- Indien u lijdt aan een chronische infectie, astma, eczeem of atopische allergie.
- Indien u een actieve ziekte (episode van bijvoorbeeld griep, verkoudheid, infectie) heeft.
- Indien u lijdt aan systemische lupus erythematosus of reumatoïde artritis.
- Bij een slechte nierfunctie.

TOT SLOT

Mocht u verhinderd zijn, belt u dan tenminste 24 uur tevoren naar HartKliniek. U kunt dan direct een nieuwe afspraak maken.

Ook bij vragen is HartKliniek bereikbaar op telefoonnummer 088 – 500 2000 (bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur).